

# Xanax SR 0,5 mg, 30 tabletek o przedłużonym uwalnianiu

Nasza cena: 28,53 zł

## Opis słownikowy

|                   |                            |
|-------------------|----------------------------|
| Dawka             | 0,5MG                      |
| Opakowanie        | *30                        |
| Postać            | Tabletki                   |
| Producent         | UPJOHN EESV HOLANDIA [NL]  |
| Rejestracja       | Lek na receptę pełnopłatny |
| Substancja czynna | ALPRAZOLAMUM               |

## Opis produktu

### Opis

## Xanax SR 0,5 mg, 30 tabletek o przedłużonym uwalnianiu

Lek przeciwlękowy z grupy pochodnych benzodiazepiny.

### Działanie

- hamujące
- uspakajające
- przeciwlękowe
- nasenne

### Wskazania do stosowania

Substancja czynna leku Xanax SR – alprazolam należy do grupy leków nazywanej pochodnymi benzodiazepin i wykazuje działanie przeciwlękowe, dlatego wskazany jest w krótkotrwałym leczeniu:

- zaburzenia lękowego uogólnionego
- zaburzenia lękowego z napadami lęku
- zaburzenia lękowego w postaci fobii
- zaburzenia depresyjnego i lękowego mieszanego

Xanax SR jest wskazany tylko w sytuacjach, w których objawy są nasilone, zaburzają prawidłowe funkcjonowanie lub są bardzo uciążliwe dla pacjenta.

Stany napięcia i niepokoju, związane z problemami dnia codziennego nie są wskazaniem do stosowania leku.

## Co zawiera i jak działa Xanax SR?

Substancją czynną preparatu jest alprazolam. Alprazolam jest pochodną benzodiazepiny o czasie działania krótkim do średniego. Wywiera, zależne od dawki, działanie hamujące na wszystkich poziomach ośrodkowego układu nerwowego, począwszy od niewielkiego uspokojenia, poprzez sen, aż do śpiączki.

Pobudza oraz ułatwia działanie hamujące kwasu gamma-aminomasłowego (GABA), który jest głównym inhibitorem przekazywania nerwowego w mózgu i odpowiada za hamowanie pre- i post-synaptyczne we wszystkich częściach ośrodkowego układu nerwowego.

W porównaniu do innych benzodiazepin, alprazolam wywiera silniejsze działanie anksjolityczne i przeciwlękowe, przy zachowaniu działania zmniejszającego napięcie mięśniowe, przeciwdrgawkowe oraz uspokajająco-nasenne.

## Dawkowanie

Doustnie. Dawkę i częstotliwość stosowania leku ustala lekarz. Uwaga! Lek należy odstawiać stopniowo, pod ścisłą kontrolą lekarza.

Uwaga! W czasie przyjmowania leku nie wolno pić alkoholu. Lek nasila działanie alkoholu.

**Leku nie stosuje się u dzieci i młodzieży do 18 roku życia.** Nie ustalono bezpieczeństwa i skuteczności stosowania leku w tej grupie pacjentów.

## Przeciwwskazania

Nie możesz stosować preparatu jeżeli jesteś uczulony (wykazujesz nadwrażliwość) na którykolwiek składnik preparatu lub na inne benzodiazepiny.

Przeciwwskazaniami do stosowania preparatu są również:

- nużliwość mięśni (myasthenia gravis)
- ciężka niewydolność oddechowa
- zespół bezdechu sennego
- ciężka niewydolność wątroby

**Preparatu nie należy stosować u dzieci i młodzieży do 18. roku życia.**

## Poinformuj lekarza

Gdy masz nadwrażliwość na alprazolam, inne benzodiazepiny lub jakąkolwiek substancję pomocniczą preparatu, miastenię, jaskrę z wąskim kątem przesączania, przewlekłą obturacyjną chorobę płuc, bezdech senny, zaburzenia funkcji wątroby. Gdy przyjmujesz leki przeciwbólowe, przeciwpadaczkowe, neuroleptyki, nasenne, uspokajające, przeciwdepresyjne, przeciwhistaminowe, digoksynę, preparaty litu, cymetydynę, etynyloestradiol, ketokonazol, itrakonazol. Ponadto należy poinformować lekarza o wszystkich ostatnio przyjmowanych lekach, nawet tych dostępnych bez recepty. Jeśli jesteś lub przypuszczasz, że jesteś w ciąży, a także gdy karmisz piersią. **Leku nie stosuje się w ciąży. Leczenie należy zakończyć odpowiednio wcześniej przed planowaną ciążą. Pochodne benzodiazepiny przenikają do pokarmu kobiecego. Nie zaleca się stosowania w okresie karmienia piersią.**

## Możliwe skutki uboczne

Działania niepożądane zwykle obserwuje się na początku terapii. Ustępują one w miarę kontynuowania leczenia lub kiedy zmniejszy się dawkę.

Bardzo często – mogą wystąpić częściej niż u 1 na 10 pacjentów:

- depresja,
- uspokojenie,
- senność,
- ataksja (niezborność ruchów),
- zaburzenia pamięci,
- zaburzenia mowy,

- zawroty głowy,
- ból głowy,
- zaparcia,
- suchość w jamie ustnej,
- zmęczenie,
- drażliwość.

Często – mogą wystąpić u 1 do 10 na 100 pacjentów:

- zmniejszenie apetytu,
- stan splątania,
- dezorientacja,
- zmniejszenie libido (popędu płciowego),
- zwiększenie libido,
- lęk,
- bezsenność,
- nerwowość,
- zaburzenia równowagi,
- nieprawidłowa koordynacja,
- zaburzenia koncentracji uwagi,
- nadmierna potrzeba snu,
- letarg,
- drżenie,
- nieostre widzenie,
- nudności,
- zapalenie skóry,
- zaburzenia seksualne,
- zmniejszenie masy ciała,
- zwiększenie masy ciała.

Niezbyt często – mogą wystąpić u 1 do 10 na 1000 pacjentów:

- mania,
- halucynacje,
- gniew,
- pobudzenie,
- niepamięć,
- osłabienie siły mięśniowej,
- nietrzymanie moczu,
- nieregularne miesiączki.

Częstość nieznaną (częstość nie może być określona na podstawie dostępnych danych):

- hiperprolaktynemia (zwiększone stężenie prolaktyny),
- hipomania,
- agresywne zachowania,
- wrogie zachowania,
- zaburzenia myślenia,
- zwiększona aktywność psychoruchowa,
- zaburzenia działania układu nerwowego autonomicznego (który kieruje funkcją narządów wewnętrznych, mięśni gładkich i gruczołów),
- dystonia (zaburzenia napięcia mięśni),
- zaburzenia żołądkowo-jelitowe,
- zapalenie wątroby,
- czynnościowe zaburzenia wątroby,
- żółtaczką,
- obrzęk naczynioruchowy,
- reakcje nadwrażliwości na światło,
- zatrzymanie moczu,

- obrzęki obwodowe (obrzęki kostek, stóp lub palców),
- zwiększenie ciśnienia w gałce ocznej.

Ponadto, szczególnie u pacjentów przyjmujących inne leki psychotropowe, z zaburzeniami psychicznymi lub nadużywających alkohol może wystąpić reakcja paradoksalna z objawem, takim jak lęk.

Inne działania niepożądane obserwowano rzadko lub bardzo rzadko: zaburzenia motoryki, padaczka, objawy psychozy, poczucie zmiany własnej osoby, agranulocytoza (znaczne zmniejszenie liczby granulocytów), reakcje alergiczne lub anafilaksja (ciężkie reakcje alergiczne).

Benzodiazepiny mogą powodować zależność fizyczną i psychiczną. Jeśli dojdzie do wytworzenia zależności fizycznej nagłe przerwanie stosowania leku Xanax SR może spowodować wystąpienie objawów odstawienia: bólu głowy, mięśni, nasilonego lęku, uczucia napięcia, pobudzenia, dezorientacji, drażliwości, poczucia zmiany otoczenia lub własnej osoby, upośledzenia słuchu, sztywności i mrowienia kończyn, nadwrażliwości na światło, hałas i dotyk, omamów i napadów padaczkowych, bezsenności i zmian nastroju. Objawy te są zwykle bardziej nasilone u pacjentów leczonych długotrwale, dużymi dawkami benzodiazepin oraz w przypadku nagłego lub szybkiego odstawienia leku.

Opisywano przypadki nadużywania benzodiazepin.

Przed użyciem zapoznaj się z ulotką, która zawiera wskazania, przeciwwskazania, dane dotyczące działań niepożądanych i dawkowanie oraz informacje dotyczące stosowania produktu leczniczego, bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu.

Powyższe dane mają charakter informacyjny i nie mogą zastąpić przeczytania ulotki leku ani wizyty u lekarza. Pełny wykaz informacji dotyczących stosowania leku znajduje się na ulotce produktu, dlatego zawsze przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu.