

Xenna Herbatka, 20 szt.



Nasza cena: 11,88 zł

Opis słownikowy

Opakowanie	*20
Postać	FIX
Producent	US PHARMACIA SP. Z O.O. POLSKA [PL]
Rejestracja	Lek bez recepty
Substancja czynna	CASSIA SENNA

Opis produktu

Opis

Xenna ziola w saszetkach do zaparzania to lek pochodzenia roślinnego, który skutecznie pomaga usunąć zaparcia. Aktywnym składnikiem herbatki Xenna jest wyciąg z liści senesu rośliny tropikalnej, której właściwości lecznicze są znane od wieków. Xenna wpływa na organizm tak, aby sam usunął zaparcia, poprzez pobudzenie perystaltyki jelita grubego. Jednocześnie w sposób naturalny reguluje wewnętrzne procesy organizmu.

Dawkowanie - Xenna Herbatką, 20 szt.

Stosować doustnie: 1 raz dziennie 1 saszetkę zalać szklanką wrzącej wody (ok.200 ml) i pozostawić do zaparzenia na 10 minut. Pić od pół szklanki naparu do całej szklanki naparu jednorazowo przed snem. Należy stosować najmniejszą dawkę Xenny powodującą uzyskanie miękkiego stolca i nie przekraczać zalecanej dawki (1 saszetka) w ciągu doby.

Składniki - Xenna Herbatka, 20 szt.

1 saszetka zawiera : Sennae folium 0,9 - 1,1 g co odpowiada 30 mg antranoidów w przeliczeniu na sennozyd B.

Działania

Xenna skutecznie pomaga usunąć zaparcia. Aktywnym składnikiem herbatki Xenna jest wyciąg z liści senesu rośliny tropikalnej, której właściwości lecznicze są znane od wieków. Xenna wpływa na organizm tak, aby sam usunął zaparcia, poprzez pobudzenie perystaltyki jelita grubego. Jednocześnie w sposób naturalny reguluje wewnętrzne procesy organizmu.

Wskazania - Xenna Herbatka, 20 szt.:

Zioła przeczyszczające do stosowania w doraźnym leczeniu zaparć.

Przeciwwskazania - Xenna Herbatka, 20 szt.

- niedrożność jelit
- ostre stany zapalne w jamie brzusznej (np. zapalenie wyrostka robaczkowego), choroba Crohna, wrzodziejące zapalenie okrężnicy,
- nadwrażliwość na sennozydy,
- niezdiagnozowane bóle w jamie brzusznej,
- stany odwodnienia z towarzyszącą utratą elektrolitów,
- miesiączka.

Nie zaleca się stosować u dzieci poniżej 12 roku życia. Nie zaleca się stosowania leku w okresie ciąży i laktacji.

Niekiedy mogą wystąpić bóle brzucha, biegunka i zaburzenia gospodarki wodno-elektrolitowej, a szczególnie niedobór potasu (hipokalemia), nudności. Przewlekłe, niezgodne z zaleceniami stosowanie może powodować przebarwienie błony śluzowej okrężnicy (pseudomelanosis coli), białkomocz i krwiomocz oraz upośledzenie czynności motorycznej jelita grubego. Sennozydy mogą zmieniać barwę moczu.

Następstwem długotrwałego stosowania Xenny może być obniżenie stężenia potasu we krwi, a to z kolei może nasilać działanie glikozydów nasercowych oraz innych środków antyarytmicznych.

Interakcje

Następstwem długotrwałego stosowania Xenny może być obniżenie stężenia potasu we krwi, a to z kolei może nasilać działanie glikozydów nasercowych oraz innych środków antyarytmicznych.

Uwagi

Nie stosować przy silnych bólach brzucha, wymiotach lub zawrotach głowy. Nie stosować w sposób ciągły dłużej niż 7-10 dni ze względu na możliwość przyzwyczajenia i nasilenia zaparć. Lek można zastosować tylko wówczas, gdy zmiana diety, a następnie łagodne środki przeczyszczające nie dały pożądaných efektów.

To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.