

# Xylogel 0,1% żel do nosa z dozownikiem

Nasza cena: 21,23 zł



## Opis słownikowy

Dawka	0,1%
Opakowanie	10g
Producent	POLFA S.A. WARSZAWA POLSKA [PL]
Rejestracja	Lek bez recepty
Substancja czynna	XYLOMETAZOLINUM

## Opis produktu

### Opis

Xylogel 0,1%, żel do nosa przeznaczony dla dorosłych i dzieci w wieku powyżej 12 lat.

### Dawkowanie - Xylogel 0,1% żel do nosa z dozownikiem

Dorośli i dzieci w wieku powyżej 12 lat: Zwykle 1 dawka żelu do każdego otworu nosowego co 8 do 10 godzin.

Nie należy stosować dawek większych niż zalecane.

Nie należy stosować dłużej niż 3 do 5 dni.

### Składniki - Xylogel 0,1% żel do nosa z dozownikiem

1 dawka zawiera 0,1 mg ksylometazoliny chlorowodoru.

### Działania

Lek Xylogel 0,1% w postaci żelu, zawiera ksylometazoliny chlorowodorek. Zastosowany na błonę śluzową nosa powoduje zwężenie naczyń krwionośnych, zmniejsza obrzęk i przekrwienie błony śluzowej jamy nosowo gardłowej oraz zmniejsza ilość wydzieliny, tj. łagodzi katar.

Dodatkowo lek, dzięki temu że jest w postaci żelu nawilża błonę śluzową nosa oraz nie ścieka na dno jamy nosa i do gardła. Xylogel 0,1% przeznaczony jest do stosowania u dorosłych i dzieci w wieku powyżej 12 lat.

### Wskazania - Xylogel 0,1% żel do nosa z dozownikiem

Preparat stosowany wspomagająco w leczeniu: ostrego nieżytu nosa wirusowego lub bakteryjnego, ostrego lub przewlekłego zaostrzającego się zapalenia zatok przynosowych, alergicznego nieżytu nosa, ostrego zapalenia ucha środkowego - w celu udrożnienia trąbki słuchowej.

### Przeciwwskazania - Xylogel 0,1% żel do nosa z dozownikiem

Nie należy stosować leku u pacjentów z przewlekłym lub naczynioruchowym zapaleniem błony śluzowej nosa.

### Przeciwwskazania - Xylogel 0,1% żel do nosa z dozownikiem

Może wystąpić suchość błony śluzowej nosa, podrażnienie błony śluzowej nosa, uczucie pieczenia w nosie i gardle, kichanie. Bardzo rzadko występują objawy działania ogólnoustrojowego: nudności, ból głowy, osłabienie, zmęczenie, senność, zaburzenia widzenia, reakcje alergiczne (duszność, obrzęk naczynioruchowy) oraz kołatanie serca, przyspieszenie czynności serca, wzrost ciśnienia tętniczego (zwłaszcza u osób z chorobami układu krążenia).

**To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.**