

Xylometazolin Wzf, krople do nosa 0,05%, 10 ml



Nasza cena: 8,76 zł

Opis słownikowy

Dawka	0,05%
Opakowanie	10ml
Postać	KROPLE
Producent	POLFA S.A. WARSZAWA POLSKA [PL]
Rejestracja	Lek bez recepty
Substancja czynna	XYLOMETAZOLINUM

Opis produktu

Opis

Xylometazolin Wzf, krople do nosa 0,05%, 10 ml

Preparat stosowany w niedrożności przewodów nosowych.

Dawkowanie - Xylometazolin Wzf, krople do nosa 0,05%, 10 ml

Dzieci powyżej 12 lat i dorośli: należy stosować lek o wyższym stężeniu chlorowodoru ksylometazoliny (1mg/g)
Dzieci w wieku od 2 do 12 lat: 1-2 krople do każdego otworu nosowego 1-2 razy na dobę

Składniki - Xylometazolin Wzf, krople do nosa 0,05%, 10 ml

Substancja czynna: ksylometazolny chlorowodorek 0,5mg/g

Substancje pomocnicze: disodu fosforan dwunastowodny, sodu diwodorofosforwan dwuwodny, sodu chlorek, benzalkoniowy bromek, woda oczyszczona.

Działania

Substancja czynna - ksylometazoliny chlorowodorek ma działanie sympatykomimetyczne - pobudza głównie receptory alfa-adrenergiczne, znajdujące się m.in. w naczyniach krwionośnych błony śluzowej nosa. Lek zwęża naczynia krwionośne błony śluzowej nosa i gardła zmniejszając jej przekrwienie, obrzęk i wysięk. Udrożnia przewody nosowe oraz przewody prowadzące z jamy nosowej do zatok przynosowych, zmniejsza wyciek z nosa i ułatwia oddychanie przez nos.

Wskazania - Xylometazolin Wzf, krople do nosa 0,05%, 10 ml

Preparat stosowany w niedrożności przewodów nosowych spowodowanej obrzękiem błony śluzowej nosa w przebiegu ostrego nieżytu nosa (m.in. w przeziębieniu i grypie). W zapaleniu zatok przynosowych. W alergicznym nieżycie błony śluzowej nosa (katar sienny).

Przeciwwskazania - Xylometazolin Wzf, krople do nosa 0,05%, 10 ml

Nadwrażliwość na ksylometazolinę, inne leki obkurczające naczynia błony śluzowej nosa lub na którykolwiek z pozostałych składników leku Xylometazolin. Jeśli u pacjenta występuje przewlekłe zanikowe zapalenie błony śluzowej nosa. Jeśli u pacjenta występuje jaskra z wąskim kątem przesączania. Nie stosować u dzieci poniżej 12 roku życia.

Przeciwwskazania - Xylometazolin Wzf, krople do nosa 0,05%, 10 ml

- Zaburzenia ogólne i stany w miejscu podania: miejscowe pieczenie, drażliwość
- Zaburzenia układu oddechowego, klatki piersiowej i śródpiersia: suchość błony śluzowej nosa, wtórny obrzęk błony śluzowej nosa, kichanie.
- Zaburzenia układu nerwowego: ból i zawroty głowy
- Zaburzenia psychiczne: bezsenność.
- Zaburzenia serca: kołatanie serca, zaburzenia rytmu serca
- Zaburzenia żołądka i jelit: nudności.
- Zaburzenie oka: niewyraźne widzenie
- Badania diagnostyczne: zwiększenie ciśnienia tętniczego krwi.

Uwagi

Nie należy stosować leku jednocześnie z lekami należącymi do inhibitorów MAO oraz trójpierścieniowymi lekami przeciwdepresyjnymi z powodu niebezpieczeństwa zwiększenia ciśnienia tętniczego krwi.

To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.