

Xylometazolin Wzf, krople do nosa 0,1%, 10 ml



Nasza cena: 10,66 zł

Opis słownikowy

Dawka	0.1%
Opakowanie	10ml
Postać	KROPLE
Producent	POLFA S.A. WARSZAWA POLSKA [PL]
Rejestracja	Lek bez recepty
Substancja czynna	XYLOMETAZOLINUM

Opis produktu

Opis

Xylometazolin Wzf, krople do nosa 0,1%, 10 ml

Preparat stosowany w niedrożności przewodów nosowych.

Dawkowanie - Xylometazolin Wzf, krople do nosa 0,1%, 10 ml

Dorośli i dzieci powyżej 12 lat: 2-3 krople do każdego otworu nosowego co 8-10 godzin. Nie podawać więcej niż 3 dawki do każdego otworu nosowego na dobę.

Składniki - Xylometazolin Wzf, krople do nosa 0,1%, 10 ml

1 ml roztworu zawiera:
substancję czynną : 1 mg ksylometazoliny chlorowodorek

substancję pomocniczą: disodu fosforan dwunastowodny, sodu diwodorofosforan jednowodny, sodu chlorek, sorbitol, disodu edetynian, benzalkoniowy chlorek roztwór, woda oczyszczona.

Działania

Substancja czynna - ksylometazoliny chlorowodorek ma działanie sympatykomimetyczne - pobudza głównie receptory alfa-adrenergiczne, znajdujące się m.in. w naczyniach krwionośnych błony śluzowej nosa. Lek zwęża naczynia krwionośne błony śluzowej nosa i gardła zmniejszając jej przekrwienie, obrzęk i wysięk. Udrożnia przewody nosowe oraz przewody prowadzące z jamy nosowej do zatok przynosowych, zmniejsza wyciek z nosa i ułatwia oddychanie przez nos.

Wskazania - Xylometazolin Wzf, krople do nosa 0,1%, 10 ml

Preparat stosowany w leczeniu pomocniczym: ostrego nieżyty nosa pochodzenia wirusowego lub bakteryjnego, ostrego lub przewlekłego zapalenia zatok przynosowych, alergicznego nieżyty nosa, ostrego zapalenia ucha środkowego.

Przeciwwskazania - Xylometazolin Wzf, krople do nosa 0,1%, 10 ml

W przypadku nadwrażliwości na którykolwiek składnik leku. U pacjentów po usunięciu przysadki lub po innych zabiegach chirurgicznych przebiegających z odsłonięciem opony twardej. W przypadku zanikowego zapalenie błony śluzowej nosa.

Przeciwwskazania - Xylometazolin Wzf, krople do nosa 0,1%, 10 ml

Podrażnienie błony śluzowej nosa, suchość błony śluzowej nosa, uczucie pieczenie w nosie i gardle, kichanie. Bardzo rzadko występują objawy działania ogólnoustrojowego: nudności, ból głowy, osłabienie, zmęczenie, senność, zaburzenia widzenia, reakcje alergiczne (duszność, obrzęk naczynioruchowy, kołatanie serca, przyspieszenie czynności serca, wzrost ciśnienia tętniczego.)

To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.