

Xylorin płyn do nosa , 18 ml

Nasza cena: 22,55 zł



Opis słownikowy

Opakowanie	18ml
Postać	PLYN DO ROZP.
Producent	PERRIGO POLAND SP. Z O.O. POLSKA [PL]
Rejestracja	Lek bez recepty
Substancja czynna	XYLOMETAZOLINUM

Opis produktu

Opis

Preparat stosowany w leczeniu objawowego zapalenia błony śluzowej nosa i zatok przynosowych.

Dawkowanie - Xylorin płyn do nosa , 18 ml

Dzieci w wieku powyżej 6 lat i dorośli - 1 do 2 dawek do każdego otworu nosowego co 8 godzin przez 3 do 5 dni.

Przed podaniem leku należy: oczyścić nos, zdjąć nasadkę ochronną z butelki, butelkę trzymać w pozycji pionowej z aplikatorem do góry, końcówkę aplikatora włożyć do otworu nosowego i nacisnąć (w tym czasie oczy i usta powinny być zamknięte), po użyciu założyć nasadkę ochronną.

Składniki - Xylorin płyn do nosa , 18 ml

Chlorowodorek ksylometazoliny 550 mcg, substancje pomocnicze: sodu octan bezwodny, kwas octowy, sodu chlorek, benzalkoniowy bromek, woda oczyszczona.

Działania

Xylorin aerazol do nosa zawiera chlorowodorek ksylometazoliny. Lek powoduje skurcz drobnych tętniczek nosa, zmniejszając obrzęk i przekrwienie błony śluzowej nosa. Prowadzi to do udrożnienia nosa, ułatwia oddychanie przez nos i zmniejsza ilość zalegającej wydzieliny. Po rozpyleniu leku na błonę śluzową nosa miejscowe obkurczenie naczyń krwionośnych występuje po 5-10 minutach i utrzymuje się przez 5 do 6 godzin.

Wskazania - Xylorin płyn do nosa , 18 ml

Leczenie objawowe zapalenia błony śluzowej nosa i zatok przynosowych.

Przeciwwskazania - Xylorin płyn do nosa , 18 ml

Nadwrażliwość na składniki preparatu, jaska z wąskim kątem przesączania, zanikowe zapalenie błony śluzowej nosa, przyjmowanie inhibitorów MAO, trójpierścieniowych leków przeciwdepresyjnych, po zabiegach usunięcia przysadki i zabiegach chirurgicznych z odsłonięciem opony twardej.

Przeciwwskazania - Xylorin płyn do nosa , 18 ml

Rzadko może wystąpić podrażnienie błony śluzowej nosa i uczucie pieczenia w nosie, suchość błony śluzowej nosa, kichanie, bóle głowy, zaburzenia widzenia, zaburzenia snu, uogólniona reakcja alergiczna, przyspieszenie czynności serca, zaburzenia rytmu serca. Dłuższe niż zalecane stosowanie leku może doprowadzić do nawrotów przekrwień błony śluzowej nosa, charakteryzującego się przewlekłym zaczerwienieniem, obrzękiem i katarzem.

Długotrwałe stosowanie może prowadzić do wtórnego tzw. polekowego zapalenia błony śluzowej nosa, opornego na leczenie.

To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.