

Xylorin Protect aerozol do nosa



Nasza cena: 24,89 zł

Opis słownikowy

Dawka	0,5 MG/ML
Opakowanie	7,5 ml
Postać	AER.D/NOSA
Producent	PERRIGO POLAND SP. Z O.O. POLSKA [PL]
Rejestracja	Lek bez recepty
Substancja czynna	OXYMETAZOLINI HYDROCHLORIDUM

Opis produktu

Opis

Xylorin Protect aerozol do nosa 0,5 mg/ml

Lek Xylorin Protect charakteryzuje się szybkim działaniem zmniejszającym przekrwienie, co zmniejsza niedrożność nosa i ułatwia oddychanie. Efekt pojawia się w ciągu kilku minut. Xylorin Protect zawiera również deksopantenol, który nawilża błonę śluzową nosa.

Wskazania do stosowania Xylorin Protect:

Lek Xylorin Protect stosuje się w krótkotrwałym leczeniu niedrożności nosa spowodowanej przeziębieniem u dorosłych i u dzieci w wieku od 10 lat.

Skład leku Xylorin Protect:

Substancją czynną leku jest oksymetazoliny chlorowodorek.

1 ml leku zawiera:

0,5 mg oksymetazoliny chlorowodoru.

Pozostałe składniki to: deksopantenol, disodu edetynian, sodu diwodorofosforan dwuwodny, disodu fosforan dwuwodny, sodu chlorek i woda oczyszczona.

Lek Xylorin Protect, aerozol do nosa nie zawiera środków konserwujących. Dlatego ze względów technicznych butelka nie jest całkowicie napełniona.

Dawkowanie Xylorin Protect:

Ten lek należy zawsze stosować dokładnie tak, jak to opisano w tej ulotce dla pacjenta, lub według zaleceń lekarza lub farmaceuty. W razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

Zalecana dawka to:

Dorośli i dzieci w wieku powyżej 10 lat: 2 rozpylenia do każdego nozdrza 2 do 3 razy na dobę.

Leku Xylorin Protect nie należy stosować dłużej niż przez 10 kolejnych dni. Stosowanie leku Xylorin Protect przez długi czas może spowodować przekrwienie błony śluzowej nosa i zatkanie nosa.

Instrukcja dla użytkownika

Przed pierwszym użyciem aerozolu, należy wypełnić pompkę. Należy trzymać butelkę pionowo i rozpylić lek 5 razy w powietrze, aż do uzyskania równomiernego aerozolu. Jeśli pompka nie była używana przez dłuższy czas, należy ją wypełnić trzema rozpyleniami w powietrze.

Wydmuchać nos. Zdjąć nasadkę ochronną.

Trzymać butelkę w pozycji pionowej.

Wsunąć końcówkę do jednego nozdrza i rozpylić liczbę dawek, jaką należy przyjąć (zgodnie z instrukcjami dawkowania podanymi powyżej). Powtórzyć czynność dla drugiego nozdrza.

Założyć z powrotem nasadkę ochronną.

Ostrzeżenia przed zastosowaniem

To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.

Stosowanie w ciąży i podczas karmienia piersią

Jeśli pacjentka jest w ciąży lub karmi piersią, przypuszcza, że może być w ciąży, lub gdy planuje mieć dziecko, powinna poradzić się lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem tego leku.

Ciąża

Nie wykazano szkodliwego działania na płód.

Karmienie piersią

Ponieważ nie przeprowadzono żadnych badań, nie wiadomo, czy lek Xylorin Protect przenika do mleka kobiety.

Prowadzenie pojazdów

Nie przeprowadzono żadnych badań, ale obecnie nie ma dowodów na wpływ leku Xylorin Protect na zdolność prowadzenia pojazdów lub obsługiwanie maszyn.

Lek Xylorin Protect a inne leki

Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach stosowanych przez pacjenta obecnie lub ostatnio, a także o lekach, które pacjent planuje stosować.

To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.

