

Zentel 400 mg, 1 sztuka - import równoległy

Nasza cena: 10,43 zł

Opis słownikowy

Dawka	400 MG
Opakowanie	*1
Postać	TABL.DO ZUCIA
Producent	DELFARMA SP. Z O.O. POLSKA [PL]
Rejestracja	Lek na receptę pełnopłatny
Substancja czynna	ALBENDAZOLUM

Opis produktu

Opis

Zentel (Albendazolum), 400 mg, tabletki do rozgryzania i żucia

Pobierz ulotkę

Spis treści

Podstawowe informacje

Skład

Dawkowanie

Ostrzeżenia i środki ostrożności

Interakcje z innymi lekami i żywieniem

Działania niepożądane / skutki uboczne

Podmiot odpowiedzialny

Podstawowe informacje

Zentel zawiera substancję czynną - albendazol o działaniu przeciworobaczym (przeciw pasożytniczym). Albendazol działa na pasożyty, robaki, ich larwy oraz na jaja, uniemożliwiając im wchłanianie cukrów (glukozy), przez co tracą one energię i giną.

Lek jest wskazany w leczeniu chorób powodowanych przez pasożyty, takich jak:

- zarażenie owsikiem ludzkim (owsica);
- zarażenie tęgoryjcem dwunastniczym (ankylostomatoza);
- zarażenie tęgoryjcem amerykańskim (nekatorioza);
- zarażenie węgorkiem jelitowym (strongyloidoza);

- zarażenie glistą ludzką (glistnica);
- zarażenie włosogłówką ludzką (trichuroza);
- zarażenie tasiemcem (tasiemczyca).

Skład

W tabeli zebrano podstawowe informacje dotyczące leku Zentel

Każda tabletkę zawiera substancję czynną:	400 mg albendazolu
Pozostałe składniki to:	laktoza, celuloza mikrokrystaliczna, skrobia kukurydziana, kroskarmeloza sodowa, powidon, sodu laurylosiarczan, żółcień pomarańczowa w postaci laku, sacharyna sodowa, magnezu stearynian, kompozycja smakowo-zapachowa waniliowa, kompozycja smakowo-zapachowa passiflory, kompozycja smakowo-zapachowa pomarańczowa.
Wygląd tabletek:	Tabletki są białopomarańczowe, podłużne, zaokrąglone, dwustronnie wypukłe, z kreską dzielącą na jednej stronie i wytłoczeniem „ALB 400” na drugiej stronie. Mają charakterystyczny owocowy zapach.
Ciąża i karmienie piersią:	Nie stosować u pacjentek w ciąży karmiących piersią
Stosowanie leku z jedzeniem i pićem:	Lek można przyjmować z jedzeniem lub bez jedzenia, popijając wodą
Ostrzeżenia:	Lek zawiera laktozę i żółcień pomarańczową
Przechowywanie leku:	Brak szczególnych warunków przechowywania. Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.
Prowadzenie pojazdów i obsługa maszyn:	Lek może powodować zawroty głowy. Jeśli wystąpią zawroty głowy, nie należy prowadzić pojazdów ani obsługiwać maszyn.

Dawkowanie / sposób podawania leku

Lek Zentel można przyjmować z jedzeniem lub bez. Nie jest konieczne podawanie leku na czczo ani po przeczyszczeniu przewodu pokarmowego.

Tabletki Zentel można połykać w całości, popijając wodą. W razie trudności z połykaniem całych tabletek, można je rozkruszyć, rozgryźć lub żuć.

Dla dzieci i pacjentów mających trudności z połykaniem tabletek możliwe jest zastosowanie leku w innej postaci (lek w postaci zawiesiny).

Zarażenie owsikami, tęgoryjcem, glistą ludzką lub włosogłówką

- Jedna tabletkę 400 mg, przyjęta jeden raz.

Zarażenie tasiemcem lub węgorkiem jelitowym

- Jedna tabletkę 400 mg raz na dobę, przez trzy kolejne dni.

Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku

W razie zażycia większej niż zalecana dawki leku, należy zgłosić się do lekarza. Jeżeli to możliwe należy pokazać opakowanie leku.

Pominięcie zastosowania leku

Nie należy zażywać dodatkowych tabletek lub dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki. Należy przyjąć następną dawkę o zwykłej porze.

Przerwanie stosowania leku

Nie należy przerywać stosowania leku Zentel bez zalecenia lekarza.

Ostrzeżenia i środki ostrożności

Przed zastosowaniem leku Zentel należy skonsultować się z lekarzem:

- jeśli pacjentka karmi piersią
- jeśli u pacjenta występują zaburzenia czynności nerek lub wątroby,
- jeśli pacjent jest w podeszłym wieku.

Należy natychmiast skontaktować się z lekarzem jeśli podczas stosowania leku Zentel wystąpią co najmniej dwa z następujących objawów:

- bóle głowy (które mogą być silne),
- drgawki,
- nudności,
- wymioty,
- zaburzenia widzenia,

Powyższe objawy mogą być powodowane przez obumieranie pasożytów znajdujących się w mózgu. U niektórych osób leczonych z powodu zarażeń pasożytniczych może występować równocześnie rzadkie, ale poważne zarażenie mózgu, spowodowane przez tasiemce: tak zwana wągryzycja ośrodkowego układu nerwowego. Pacjent może nie wiedzieć, że ma to zarażenie, a podanie leku Zentel może je ujawnić.

Nie należy stosować leku Zentel jeśli:

- u pacjenta stwierdzono uczulenie na albendazol lub którykolwiek z pozostałych składników leku
- pacjentka jest w ciąży

Lek Zentel zawiera laktozę i żółcień pomarańczową

Interakcje z innymi lekami i pożywieniem

Niektóre leki mogą mieć wpływ na działanie leku Zentel lub też zwiększać ryzyko działań niepożądanych. Do tych leków należą:

- cymetydyna;
- prazykwantel;
- deksametazon;
- rytonawir;
- fenytoina;
- karbamazepina;
- fenobarbital;

Stosowanie leku Zentel z jedzeniem i pićm

Lek Zentel można przyjmować z jedzeniem lub bez jedzenia, popijając wodą.

Ciąża i karmienie piersią

Lek może spowodować uszkodzenie płodu.

Jeśli kobieta jest w ciąży lub podejrzewa, że jest w ciąży, stosowanie leku Zentel jest przeciwwskazane.

Jeśli pacjentka karmi piersią powinna poradzić się lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem tego leku.

U kobiet w wieku rozrodczym zaleca się przyjmowanie leku Zentel w ciągu pierwszych 7 dni od wystąpienia miesiączki lub po uzyskaniu

ujemnego wyniku testu ciążowego. Ma to na celu uniknięcie stosowania leku Zentel we wczesnym okresie ciąży.

Działania niepożądane / skutki uboczne

Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

Niezbyt częste działania niepożądane:

- ból głowy, zawroty głowy
- nudności, wymioty, ból brzucha, biegunka.

Rzadkie działania niepożądane:

- objawy nadwrażliwości (np. wysypka, pokrzywka, świąd).

Rzadkie objawy niepożądane, które mogą uwidocznić się w badaniach krwi:

- zwiększenie aktywności enzymów wątrobowych.

Bardzo rzadkie działania niepożądane:

- ciężkie reakcje skórne;
- rumień wielopostaciowy;
- zespół Stevensa-Johnsona;

Powyższe dane mają charakter informacyjny i nie mogą zastąpić przeczytania ulotki leku ani wizyty u lekarza. Pełny wykaz informacji dotyczących stosowania leku znajduje się na ulotce produktu, dlatego zawsze przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu.