

Zincuprin, 60 tabletek



Nasza cena: 20,95 zł

Opis słownikowy

| | |
|-------------|-------------------|
| Opakowanie | *60 |
| Postać | Tabletki |
| Producent | AXXON POLSKA [PL] |
| Rejestracja | Suplement diety |

Opis produktu

Opis

Zincuprin, 60 tabletek

Suplement diety Zincuprin uzupełnia codzienną dietę w cynk i miedź. Cynk i miedź są pierwiastkami niezbędnymi do regulacji procesów metabolicznych organizmu

Dawkowanie - Zincuprin, 60 tabletek

Dzieci od 4 - 11 r.ż. - 1 tabletkę dziennie
Dorośli i młodzież powyżej 12 r.ż. - 3 tabletki dziennie. 1 godzina przed lub 2 godziny po posiłku

Składniki - Zincuprin, 60 tabletek

Glukonian cynku, glukonian miedzi oraz celuloza mikrokrystaliczna (substancja wypełniająca) i stearynian magnezu (substancja przeciwzbrylająca)

Działania

Cynk:
- jest mikroelementem regulującym funkcje wydzielnicze skóry, między innymi wspomaga szybsze gojenie się ran,
- jest jednym z najważniejszych pierwiastków śladowych niezbędnych do prawidłowych przemian komórkowych

Miedź:
- bierze udział w procesach przemian metabolicznych
- wspomaga funkcjonowanie układu immunologicznego
- przyczynia się do ochrony komórek przed uszkodzeniem powodowanym przez wolne rodniki

Wskazania - Zincuprin, 60 tabletek

Pomocniczo w walce z problemami skóry związanymi z nadmierną czynnością gruczołów łojowych (np. trądzik młodzieńczy lub łojotok)

Przeciwwskazania - Zincuprin, 60 tabletek

Bezwarunkowym przeciwwskazaniem do stosowania preparatu są niewydolność nerek oraz choroba Wilsona (zaburzenie przemian metabolicznych miedzi)

W okresie ciąży i karmienia piersią nie należy stosować preparatu Zincuprin bez uprzedniej konsultacji z lekarzem.

Przeciwwskazania - Zincuprin, 60 tabletek

Mogą wystąpić następujące działania niepożądane: ból głowy, nudności, biegunka, metaliczny posmak.

INFORMACJE DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA

Nie przekraczać zalecanej dziennej porcji do spożycia.

Suplement diety nie może być stosowany jako substytut (zamiennik) zróżnicowanej diety.

Dla zdrowia ważna jest zróżnicowana dieta oraz zdrowy tryb życia.

Przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci.

Nie należy stosować preparatu w przypadku nadwrażliwości na którykolwiek składnik preparatu.

Nie należy spożywać po upływie daty minimalnej trwałości.