

# Zinkorot 25mg Zn<sup>2+</sup>, 50 tabletek

Nasza cena: 24,02 zł



## Opis słownikowy

Opakowanie	*50
Postać	Tabletki
Producent	WOERWAG PHARMA GMBH & KO.KG NIEMCY [DE]
Rejestracja	Lek bez recepty
Substancja czynna	ZINCUM

## Opis produktu

### Opis

## Zinkorot 25mg Zn<sup>2+</sup>, 50 tabletek

Zinkorot to lek w formie tabletek uzupełniający niedobory cynku. Lek stosuje się w przypadku gdy uzupełnianie niedoborów cynku dietą jest niewystarczające. Zinkorot można podawać dorosłym oraz dzieciom w wieku powyżej 6 lat.

### Wskazania

Wskazaniem do zastosowania tabletek Zinkorot są niedobory cynku, których pacjent nie może uzupełnić dietą.

### Dawkowanie

Lek podaje się doustnie, popijając odpowiednią ilością płynu. Nie łączyć tabletek Zinkorot z jedzeniem. Tabletki można dzielić na połowy.

Zwykle stosowane dawkowanie leku Zinkorot zależy od wieku pacjenta. U dorosłych oraz młodzieży w wieku 12 do 17 lat zwykle stosuje się 12,5 do 25 mg cynku, czyli od pół do 1 tabletki dziennie. W przypadku dzieci w wieku od 6 do 11 lat dawkowanie wynosi pół tabletki na dobę.

### Skład

Substancją czynną leku jest cynk w formie ortonianu cynku dwuwodnego (Zinci orotas dihydricus).

1 tabletkę zawiera 25 mg cynku w postaci 157,36 mg ortonianu cynku dwuwodnego.

Substancje pomocnicze: krzemionka koloidalna bezwodna, celuloza mikrokrystaliczna, powidon K-30, kroscarmeloza sodowa, talk,

magnezu stearynian.

#### Dawkowanie

Ten lek należy zawsze przyjmować zgodnie z zaleceniami lekarza lub farmaceuty. W razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

Dorośli i młodzież w wieku 12-17 lat: zalecana dawka to 12,5 do 25 mg cynku (1/2 - 1 tabletki) na dobę.

Dzieci w wieku 6 do 11 lat: zalecana dawka dobową wynosi 12,5 mg cynku (1/2 tabletki).

Lek Zinkorot należy przyjmować doustnie z wystarczającą ilością płynu (np. szklanką wody). Nie przyjmować bezpośrednio przed ani po posiłku. Tabletkę można podzielić na połowy. Leku Zinkorot nie należy przyjmować razem z posiłkami.

#### Przeciwwskazania

Nie stosować w przypadku nadwrażliwości na którykolwiek ze składników preparatu. Nie należy stosować leku Zinkorot u dzieci poniżej 6 lat. Leku Zinkorot nie należy stosować w okresie ciąży, chyba, że lekarz zaleci inaczej. Nie zaleca się stosowania tego leku u kobiet karmiących piersią.

Objawy przedawkowania: zaburzenia żołądkowo-jelitowe, metaliczny smak na języku, ból brzucha, nudności, wymioty, senność, ból głowy, niedokrwistość (zmniejszona liczba czerwonych płytek krwi) oraz zawroty głowy.

Przed użyciem zapoznaj się z ulotką, która zawiera wskazania, przeciwwskazania, dane dotyczące działań niepożądanych i dawkowanie oraz informacje dotyczące stosowania produktu leczniczego, bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu.

**To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.**