

Zinnat 250 mg 50 ml

Nasza cena: 20,65 zł

Opis słownikowy

Dawka	250MG
Opakowanie	50ml
Postać	ZAW.
Producent	GLAXO WELLCOME GROUP, GLAXO WELLCOME HOUSE WIELKA BRYTANIA [GB]
Rejestracja	Lek na receptę
Substancja czynna	CEFUROXIMUM

Opis produktu

Opis

Wskazania:

Lek należy stosować jeżeli u pacjentów wystąpiły dolegliwości związane z:

- ostrym paciorkowcowym zapaleniem gardła i migdałków,
- bakteryjnym zapaleniem zatok przynosowych,
- ostrym zapaleniem ucha środkowego,
- zaostrzeniem przewlekłego zapalenia oskrzeli,
- zapaleniem pęcherza moczowego,
- odmiedniczkowym zapaleniem nerek,
- niepowikłanym zakażeniem skóry i tkanek miękkich,
- leczeniem wczesnej postaci choroby z Lyme (boreliozy).

Dawkowanie:

Normalny czas leczenia wynosi od 5 do 10 dni. Preparat w postaci zawiesiny należy przyjmować w trakcie posiłku w celu zapewnienia optymalnego wchłaniania.

Dorośli.

W większości zakażeń:

- 250 mg 2 razy na dobę.

Zakażenia dróg moczowych:

- 125 mg 2 razy na dobę.

Odmiedniczkowe zapalenie nerek:

- 250 mg 2 razy na dobę.

Zakażenia dolnych dróg oddechowych:

lekkie i średnio nasilone (zapalenie oskrzeli):

- 250 mg 2 razy na dobę,

ciężkie lub podejrzenie zapalenia płuc:

- 500 mg 2 razy na dobę.

Niepowikłana rzeżączka:

- jednorazowa dawka 1 g.

Choroba z Lyme (borelioza), dorośli i dzieci powyżej 12 lat:

- 500 mg 2 razy na dobę przez 20 dni.

U dzieci dawkę produktu należy dostosować do wieku i masy ciała:

W większości zakażeń:

- zwykle 125 mg 2 razy na dobę (lub 20 mg na każdy kilogram masy ciała na dobę w dwóch dawkach), maksymalnie 250 mg na dobę.

W zapaleniu ucha środkowego u dzieci od 3 m-cy do 2 lat:

- zwykle 125 mg 2 razy na dobę (lub 20 mg na każdy kilogram masy ciała na dobę w dwóch dawkach), maksymalnie 250 mg na dobę.

W ciężkich zakażeniach lub w zapaleniu ucha środkowego u dzieci powyżej 2 lat:

- 250 mg 2 razy na dobę (lub 30 mg na każdy kilogram masy ciała na dobę w dwóch dawkach), maksymalnie 500 mg na dobę.

Działanie:

Aksetyl cefuroksymu - substancja czynna produktu, jest prekursorem antybiotyku z grupy cefalosporyn II generacji, podawanym doustnie, opornym na działanie większości beta-laktamaz. Mechanizm działania polega na hamowaniu syntezy ściany komórkowej drobnoustroju przez wiązanie białek biorących udział w tym procesie.

Skład:

5 ml zawiesiny zawiera 250 mg cefuroksymu.

Przeciwwskazania:

Nie należy stosować leku jeżeli u pacjentów występuje nadwrażliwość na którykolwiek ze składników preparatu bądź też nadwrażliwość na antybiotyki cefalosporynowe.

Działania niepożądane:

Działania niepożądane preparatu Zinnat, zazwyczaj są lekkie i przemijające.

- kandydoza,
- eozynofilia,
- małopłytkowość;
- wysypki skórne,
- pokrzywka,
- świąd skóry,
- gorączka polekowa,
- choroba posurowicza,
- wstrząs anafilaktyczny,
- niestrawność,
- biegunka,
- nudności,
- bóle brzucha,
- wymioty.

W celu zasięgnięcia dogłębnych informacji dotyczących działań niepożądanych należy zapoznać się z ulotką dołączoną do opakowania lub też skonsultować się z lekarzem lub farmaceutą.

Powyższe dane mają charakter informacyjny i nie mogą zastąpić przeczytania ulotki leku ani wizyty u lekarza. Pełny wykaz informacji dotyczących stosowania leku znajduje się na ulotce produktu, dlatego zawsze przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu.