

# Zocor 10 28 tabletek 10 mg

Nasza cena: 5,17 zł

## Opis słownikowy

Dawka	10MG
Opakowanie	*28
Postać	Tabletki
Producent	MSD POLSKA SP. Z O.O. POLSKA [PL]
Rejestracja	Lek na receptę
Substancja czynna	SIMVASTATINUM

## Opis produktu

### Opis

### Wskazania:

- leczenie pierwotnej hipercholesterolemii lub mieszanej dyslipidemii
- leczenie rodzinnej homozygotycznej hipercholesterolemii
- zapobieganie zdarzeniom ze strony układu sercowo-naczyniowego.
- zmniejszenie zachorowań i umieralności na choroby układu sercowo-naczyniowego

### Dawkowanie:

Dawka leku powinna zostać ustalona indywidualnie dla każdego pacjenta na podstawie przeprowadzonych badań oraz wywiadu. Leczenie powinno przebiegać w skojarzeniu ze ścisłą dietą

- zalecana dawka jaka można stosować waha się w zakresie od 5 do 80 mg podawane raz na dobę,
- produkt należy stosować doustnie, najlepiej wieczorem,
- jeżeli istnieje taka konieczność, dawkę należy korygować w odstępach co najmniej 4 tygodniowych do maksymalnej dawki 80 mg podawanych raz na dobę, wieczorem,
- dawka 80 mg na dobę jest zalecana tylko pacjentom z ciężką hipercholesterolemią i dużym ryzykiem powikłań ze strony układu sercowo-naczyniowego,

## Działanie:

- zmniejsza ilość „złego” cholesterolu,
- wpływa na zwiększenie ilości „dobrego” cholesterolu,
- obniża poziom cholesterolu we krwi.

## Skład:

1 tabletkę powlekana zawiera 10 mg simwastatyny.

## Przeciwwskazania:

Istnieją różnego rodzaju przeciwwskazania do stosowania leku.

### Do najważniejszych z nich należą:

- nadwrażliwość na symwastatynę lub na którąkolwiek substancję pomocniczą.
- czynna choroba wątroby
- ciąża i okres karmienia piersią.

Szerzej przeciwwskazania do stosowania leku zostały opisane w ulotce informacyjnej.

## Działania niepożądane:

### Działania niepożądane jakie mogą występować podczas stosowania leku to:

- niedokrwistość,
- bezsenność,
- zaparcia,
- bóle brzucha,
- wzdęcia z oddawaniem wiatrów,
- niestrawność,
- biegunka,
- nudności,
- wymioty,
- zapalenie trzustki,
- wysypka,
- świąd,
- astenia.

Więcej informacji na temat działań niepożądanych zostało zawartych w ulotce informacyjnej dołączonej do opakowania. Warto

zauważyć, iż działania niepożądane mogą występować tylko u części pacjentów. Istotne jest również to, iż działania te mogą różnić się w zależności od pacjenta oraz stopnia zaawansowania choroby. Jeżeli pacjent ma wątpliwości co do stosowania leku powinien skonsultować się z lekarzem prowadzącym.

Powyższe dane mają charakter informacyjny i nie mogą zastąpić przeczytania ulotki leku ani wizyty u lekarza. Pełny wykaz informacji dotyczących stosowania leku znajduje się na ulotce produktu, dlatego zawsze przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu.