

Zovirax Duo, krem 2g



Nasza cena: 36,12 zł

Opis słownikowy

Opakowanie	2g
Postać	KREM
Producent	GLAXO WELLCOME GROUP, GLAXO WELLCOME HOUSE WIELKA BRYTANIA [GB]
Rejestracja	Lek bez recepty
Substancja czynna	ACICLOVIRUM, HYDROCORTISONUM

Opis produktu

Opis

Lek Zovirax Duo krem stosuje się w leczeniu wczesnych objawów przedmiotowych i podmiotowych opryszczki warg i twarzy (takich jak: mrowienie, swędzenie lub zaczerwienienie), w celu zmniejszenia ryzyka przejścia epizodów opryszczki w zmiany wrzodziejące.

Dawkowanie - Zovirax Duo, krem 2g

Dorośli i dzieci w wieku powyżej 12 lat: krem działa najlepiej, jeśli leczenie jest rozpoczęte po wystąpieniu pierwszych objawów zakażenia. Warstwę kremu należy nakładać na zmienioną powierzchnię 5 razy na dobę. odpowiada to stosowaniu kremu co 3-4 godziny w ciągu dnia. Leczenie należy kontynuować przez 5 dni.

Składniki - Zovirax Duo, krem 2g

1 g kremu zawiera:

50 mg acyklowiru i 10 mg hydrokortyzonu.

Inne składniki: parafina ciekła, wazelina biała, izopropylu mirystynian, sodu laurylosiarczan, alkohol cetostearylowy, poloksamer 188, glikol propylenowy, kwas cytrynowy jednowodny, sodu wodorotlenek, kwas solny, woda oczyszczona.

Działania

Substancja czynna leku, acyklowir, hamuje wzrost wirusa. Druga substancja czynna, hydrokortyzon, pomaga w leczeniu stanu zapalnego, który występuje podczas opryszczki.

Jeśli opryszczka już się rozwinęła, stosowanie preparatu skraca czas gojenia zmian o około pół do jednego dnia, w porównaniu do kremu nie zawierającego substancji czynnych.

Wskazania - Zovirax Duo, krem 2g

Opryszczka warg (Herpes simplex).

Przeciwwskazania - Zovirax Duo, krem 2g

Nie stosować leku u pacjenta jeśli stwierdzono uczulenie na którykolwiek z jego składników.

Nie stosować leku jeśli pacjent ma inne zmiany chorobowe na skórze warg i twarzy, niż te, które zazwyczaj występują w przypadku opryszczki (np. zakażenia grzybicze, bakteryjne lub pasożytnicze).

Przeciwwskazania - Zovirax Duo, krem 2g

Często: wysuszenie i łuszczenie się skóry

Niezbyt często: mrowienie lub pieczenie po nałożeniu kremu

Rzadko: objawy zapalenia, takie jak obrzęk warg, rumień, zaburzenia w zabarwieniu skóry.

To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.