

Zovirax Intensive Krem 5%



Nasza cena: 22,64 zł

Opis słownikowy

Opakowanie	2g
Producent	GLAXOSMITHKLINE CONSUMER HEALTHCARE SP. Z O.O. POLSKA [PL]
Rejestracja	Lek bez recepty
Substancja czynna	ACICLOVIRUM

Opis produktu

Opis

Zovirax Intensive (Aciclovirum) 50 mg/g krem

Dawkowanie - Zovirax Intensive Krem 5%

Lek Zovirax Intensive w postaci kremu jest przeznaczony do stosowania na skórę. Zwykle, o ile lekarz nie zaleci inaczej, lek stosuje się jak opisano poniżej. Lek należy nakładać 5 razy na dobę na chorobowo zmienione miejsca na skórze w odstępach około czterogodzinnych, z przerwą nocną. Lek działa najskuteczniej, jeśli leczenie rozpoczyna się jak najszybciej po pojawieniu się pierwszych objawów opryszczki, jak np.: pieczenie, swędzenie lub zaczerwienienie. Leczenie można również rozpocząć w późniejszym okresie choroby, gdy wystąpią grudki lub pęcherzyki. Stosowanie leku dodatkowo wokół zmian chorobowych zwiększa skuteczność leczenia opryszczki. Leczenie należy prowadzić co najmniej przez 4 dni. Jeżeli nie nastąpiło zagojenie zmian skórnych, leczenie można przedłużyć do 10 dni. Jeśli zmiany chorobowe nie ustąpią po 10 dniach stosowania leku, należy skonsultować się z lekarzem.

Składniki - Zovirax Intensive Krem 5%

1 gram kremu zawiera substancję czynną 50mg acyklowiru

Substancje pomocnicze: glikol propylenowy, Wazelina biała, alkohol cetostearylowy, parafina ciekła, poloksamer 407, sodu laurylosiarczan, arlancel 165, dimetykon 20, woda oczyszczona

Działania

Lek Zovirax Intensive zawiera substancję czynną acyklowir o działaniu przeciwwirusowym, wykazującym silnie działanie na wirusa opryszczki pospolitej

Wskazania - Zovirax Intensive Krem 5%

Jest wskazany w miejscowym leczeniu nawrotnej opryszczki warg i twarzy, wywołanych przez wirusa opryszczki pospolitej.

Przeciwwskazania - Zovirax Intensive Krem 5%

Nadwrażliwość na acyklowir, walacyklowir, glikol propylenowy lub którąkolwiek z substancji pomocniczych leku.

Przeciwwskazania - Zovirax Intensive Krem 5%

Jak każdy lek, lek Zovirax Intensive może powodować działania niepożądane. Mogą wystąpić następujące działania niepożądane: Często: łagodne wysuszenie lub złuszczenie skóry. Niezbyt często: przemijające uczucie pieczenia lub mrowienia, swędzenie. Rzadko: rumień, kontaktowe zapalenie skóry po zastosowaniu leku Zovirax Intensive. Bardzo rzadko: nagłe reakcje nadwrażliwości, w tym ciężkie, jak obrzęk naczynioruchowy. U niektórych osób w czasie stosowania leku Zovirax Intensive mogą wystąpić inne działania niepożądane. W przypadku wystąpienia objawów niepożądanych, również niewymienionych w tej ulotce, należy poinformować o nich lekarza.

Uwagi

Ciąża i karmienie piersią - przed zastosowaniem leku należy skontaktować się z lekarzem

To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.