

Zoxon 4 30 tabletek 4 mg

Nasza cena: 10,52 zł

Opis słownikowy

Dawka	4MG
Opakowanie	*30
Postać	Tabletki
Producent	LECIVA PRAGA CZECHY [CZ]
Rejestracja	Lek na receptę
Substancja czynna	DOXAZOSINUM

Opis produktu

Opis

Wskazania:

Produkt może być stosowany w dwóch przypadkach:

- łagodny rozrost gruczołu krokowego,
- samoistne nadciśnienie tętnicze.

Dawkowanie:

Stosowanie leku powinno być skonsultowane z lekarzem prowadzącym, który ustala dawkę indywidualną dla każdego pacjenta.

Łagodny rozrost gruczołu krokowego:

- dawka początkowa wynosi 1 mg raz na dobę,
- jeżeli istnieje taka konieczność po 1-2 tygodniach leczenia dawkę dobową można zwiększyć do 2 mg raz na dobę, a następnie do 4 mg raz na dobę,
- maksymalna zalecana dawka wynosi 8 mg doksazosyny na dobę.

Samoistne nadciśnienie tętnicze:

- leczenie (podobnie jak w przypadku rozrostu krokowego) należy rozpoczynać od dawki 1 mg raz/dobę,

- po upływie 1-2 tygodni od rozpoczęcia leczenia dawkę można zwiększyć do 2 mg raz na dobę, następnie do 4 mg raz na dobę, a następnie do 8 mg raz na dobę,
- najpopularniejsza stosowana dawka wynosi od 2 do 4 mg raz na dobę,
- maksymalna zalecana dawka wynosi 16 mg doksazosyny na dobę.

Działanie:

- rozkurcza naczynia krwionośne,
- obniża ciśnienie tętnicze krwi,
- zmniejsza dolegliwości związane z przerostem gruczołu krokowego.

Skład:

1 tabletkę zawiera 4 mg doksazosyny (w postaci mezylanu doksazosyny).

Przeciwwskazania:

Produktu nie należy stosować:

- u pacjentów ze stwierdzoną nadwrażliwością na substancję czynną lub inne pochodne chinazoliny lub na którąkolwiek substancję pomocniczą,
- u pacjentów z niedociśnieniem ortostatycznym w wywiadzie,
- u pacjentów z łagodnym rozrostem gruczołu krokowego i współistniejącym przekrwieniem górnego odcinka dróg moczowych,
- w przewlekłym zakażeniu dróg moczowych,
- u pacjentów z kamicą pęcherza moczowego,
- u kobiet karmiących piersią.

Działania niepożądane:

Podczas stosowania leku mogą występować różnego rodzaju działania niepożądane.

Do najczęstszych z nich należą:

- zakażenia dróg oddechowych,
- zakażenia dróg moczowych,
- senność,
- zawroty głowy pochodzenia ośrodkowego,
- ból głowy,
- zawroty głowy pochodzenia błędnikowego,
- uczucie kołatania serca,
- tachykardia,

- niedociśnienie,
- niedociśnienie ortostatyczne,
- zapalenie oskrzeli,
- kaszel,
- duszność,
- ból brzucha,
- niestrawność,
- suchość w ustach,
- ból pleców,
- bóle mięśni.

Więcej informacji na temat działań niepożądanych zostało zawarte w ulotce informacyjnej dołączonej do opakowania. Jeżeli pacjent ma wątpliwości co do działań niepożądanych powinien skonsultować się z lekarzem lub farmaceutą.

Powyższe dane mają charakter informacyjny i nie mogą zastąpić przeczytania ulotki leku ani wizyty u lekarza. Pełny wykaz informacji dotyczących stosowania leku znajduje się na ulotce produktu, dlatego zawsze przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu.