

Zyx, 5mg, 28 tabletek

Nasza cena: 10,31 zł

Opis słownikowy

Dawka	5MG
Opakowanie	*28
Postać	TABL.POWL.
Producent	BIOFARM SP.Z O.O.POZNAŃ POLSKA [PL]
Rejestracja	Lek na receptę
Substancja czynna	LEVOCETIRIZINE

Opis produktu

OPIS

Tabletki powlekane Zyx to lek zawierający substancję czynną lewocetyryzyny dichlorowodorek. Zyx działa przeciwalergicznie. Lek jest stosowany w celu złagodzenia objawów alergicznego zapalenia błony śluzowej nosa oraz pokrzywki.

SKŁAD

Substancją czynną leku jest *lewocetyryzyny dichlorowodorek*.

Każda tabletkę powlekana zawiera 5 mg lewocetyryzyny dichlorowodoru.

Substancje pomocnicze: Rdzeń tabletki: laktoza jednowodna, celuloza mikrokrystaliczna, krzemionka koloidalna bezwodna, magnezu stearynian. Otoczkę: hypromeloza, tytanu dwutlenek (E171), makrogol 400.

DAWKOWANIE

Ten lek należy zawsze stosować dokładnie według zaleceń lekarza. W razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

Dawkowanie ustala lekarz indywidualnie dla pacjenta.

Lek Zyx jest przeznaczony do stosowania doustnego. Tabletkę należy połykać w całości, popijając szklanką płynu. Lek może być przyjmowany podczas posiłku lub między posiłkami.

DZIAŁANIE LEKU

Lek Zyx działa przeciwhistaminowo.

WSKAZANIA DO STOSOWANIA

Zyx jest wskazany w objawowym leczeniu alergicznego zapalenia błony śluzowej nosa oraz pokrzywki.

PRZECIWWSKAZANIA

Nie należy stosować leku w przypadku nadwrażliwości na którykolwiek składnik produktu oraz jeśli pacjent ma ciężkie zaburzenia czynności nerek z klirensen kreatyniny mniejszym niż 10 ml/min.

OSTRZEŻENIA DOTYCZĄCE DZIAŁANIA LEKU

Należy zachować ostrożność i skonsultować się z lekarzem jeśli pacjent: ma zaburzenia czynności nerek; ma padaczkę.

Jeśli pacjent ma zaplanowane wykonanie testów alergicznych, należy skonsultować z lekarzem czy pacjent powinien przerwać stosowanie leku Zyx na kilka dni przed wykonaniem testów, ponieważ lek może mieć wpływ na wyniki testów alergicznych.

Lek zawiera laktozę.

INTERAKCJE Z INNYMI LEKAMI

Należy powiedzieć lekarzowi o wszystkich lekach przyjmowanych przez pacjenta obecnie lub ostatnio, a także o lekach, które pacjent planuje przyjmować, w tym również o tych, które wydawane są bez recepty.

CIĄŻA I KARMIENIE PIERSIĄ

Jeśli pacjentka jest w ciąży lub karmi piersią, przypuszcza, że może być w ciąży, lub gdy planuje mieć dziecko, powinna poradzić się lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem tego leku.

STOSOWANIE U DZIECI

Nie należy stosować leku u dzieci w wieku poniżej 6 lat.

STOSOWANIE LEKU Z ALKOHOLEM, JEDZENIEM I PICIEM

Nie są wymagane szczególne środki ostrożności, jednak działanie leku może ulegać opóźnieniu, jeśli jest on przyjmowany z jedzeniem. Nie wykazano, aby spożywanie alkoholu i przyjmowanie leku Zyx nasilało działanie którejkolwiek substancji, jednak zaleca się zachowanie ostrożności podczas stosowania leku Zyx i picia alkoholu w tym samym czasie.

U wrażliwych pacjentów, jednoczesne podawanie leku Zyx z alkoholem lub innymi substancjami wpływającymi na czynność mózgu, może spowodować dodatkowe obniżenie czujności i zdolności reagowania.

PROWADZENIE POJAZDÓW I OBSŁUGA MASZYN

Ten lek może powodować u niektórych pacjentów senność, zmęczenie i wyczerpanie. Jeśli pacjent zamierza prowadzić pojazdy, wykonywać potencjalnie niebezpieczne czynności lub obsługiwać maszyny, powinien wcześniej poznać swoją reakcję na lek.

DZIAŁANIA NIEPOŻĄDANE / SKUTKI UBOCZNE

Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

Działania niepożądane występujące często (mogą wystąpić rzadziej niż u 1 na 10 pacjentów): suchość w jamie ustnej, bóle głowy, zmęczenie i senność/ospałość.

Więcej informacji w ulotce dołączonej do leku.

PRZECHOWYWANIE

Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

PODMIOT ODPOWIEDZIALNY

Biofarm Sp. z o. o.

Wałbrzyska 13
60-198 Poznań

Powyższe dane mają charakter informacyjny i nie mogą zastąpić przeczytania ulotki leku ani wizyty u lekarza. Pełny wykaz informacji dotyczących stosowania leku znajduje się na ulotce produktu, dlatego zawsze przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu.